



La imagen del mes

Abdomen agudo por aneurisma disecante del tronco celíaco



Acute abdomen caused by a dissecting celiac trunk aneurysm

José Andrés Guirola Ortiz^{a,b,*}, Victoria Mayoral Campos^{a,b}, Patricia Menal Muñoz^a y María José Gimeno Peribáñez^{a,b}

^a Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España

^b Grupo de Investigación de Técnicas Mínimamente Invasivas (GITMI)




Figura 1

Varón de 60 años, que acude por dolor epigástrico que irradia hacia la zona dorsal, de varias horas de evolución. Acudió a su centro de salud por dolor epigástrico con cifras tensionales altas (220/110), y dolor intenso que ha precisado de rescates de analgesia. Es derivado al hospital donde se le realiza una TC abdominopélvica para descartar síndrome aórtico agudo. La exploración radiológica muestra una formación aneurismática de 10 mm de diámetro, con fisuración y presencia de trombo mural, dependiente del tronco celíaco. La aorta presenta calibre dentro de los límites normales (fig. 1).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: joseandresguirola@gmail.com (J.A. Guirola Ortiz).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.05.009>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.