



La imagen del mes

Absceso isquiorrectal con extensión intra y preperitoneal



Ischioarectal abscess with intra and preperitoneal dissemination

Natalia Rodríguez López*, Ana María Paulos Gómez, Lucía Lesquereux Martínez y Manuel Bustamante Montalvo

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España




Figura 1

Varón de 50 años con retraso mental, intervenido de absceso perianal izquierdo 10 días antes, que consulta por vómitos. Presenta distensión abdominal, peritonismo difuso y eritema isquiorrectal derecho. La tomografía computarizada abdominal objetivó neumoperitoneo, líquido intraabdominal y colección fluida con gas en espacio presacro, Retzius y Bogros derechos, con alteraciones inflamatorias en fosas isquiorrectal e isquioanal homolaterales (fig. 1).

Se realizó laparotomía media, objetivándose salida de pus por espacio de Retzius comunicando con espacio pararectal derecho, drenándose por vía extraperitoneal y perianal, así como peritonitis purulenta difusa, sin origen intraabdominal. Se realizó colostomía de descarga en fosa iliaca izquierda.

El paciente precisó ingreso prolongado en la unidad de cuidados intensivos, con evolución favorable e infección de herida.

No requirió reintervenciones. Fue dado de alta al 37.º día postoperatorio.

Diagnóstico: Absceso perianal con extensión al espacio preperitoneal y cavidad abdominal.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: rodriguezlopeznatalia@gmail.com (N. Rodríguez López).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.05.015>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.