



La imagen del mes

Obstrucción aorto-bi-ilíaca yuxtarenal en paciente con vena cava inferior izquierda



Juxtarenal aortoiliac occlusive disease in a patient with left sided inferior vena cava

Delfina Fletcher Sanfeliu*, Cristina Rueda Muñoz, Iván Martín-González y José Ángel Bahamonde Romano

Servicio de Cirugía Cardiovascular, Hospital Clínico Universitario Valencia, Valencia, España



Figura 1




Figura 2

Paciente de 58 años con isquemia crítica del miembro inferior derecho. La angio-TC mostraba una obstrucción aorto-bi-ilíaca, desde zona yuxtarenal, y una vena cava inferior izquierda (VCII) que cruzaba al lado derecho por delante de la aorta a nivel yuxtarenal (fig. 1).

Por laparotomía media se realizó bypass aorto-bifemoral con injerto de Dacron® de 14 × 7 × 7 mm, siendo necesaria la movilización de la VCII para permitir un clampaje suprarrenal y la realización de anastomosis proximal término-terminal (fig. 2).

El paciente recuperó el pulso pedio bilateral, y el periodo postoperatorio cursó con fracaso renal agudo transitorio. Fue dado de alta a los 7 días de la operación.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: delfletsan@gmail.com (D. Fletcher Sanfeliu).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.10.011>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.