



La imagen del mes

Bazo errante

Wandering spleen


Veysel Ayyildiz^a, Bulent Guvendi^b, Hayri Ogul^{c,*} y Mecit Kantarci^c^a Department of Radiology, School of Medicine, Siirt State Hospital, Siirt, Turkey^b Department of General Surgery, Medical Faculty, Kafkas University, Kars, Turkey^c Department of Radiology, Medical Faculty, Ataturk University, Erzurum, Turkey

Figura 1

Una mujer de 36 años de edad presentó una historia de dolor en el hipogastrio durante 6 meses. En el examen físico se palpó una masa ovoide de gran tamaño. En las imágenes de la resonancia magnética (RM) se observó la ausencia del bazo en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, así como un bazo aumentado de tamaño en la región hipogástrica (figs. 1A y B). En la RM de contraste, el bazo presentó una estructura parenquimal relativamente homogénea (fig. 1C). Durante el período de 6 meses de seguimiento y a raíz de la repentina evolución del dolor abdominal se realizó una esplenectomía de urgencia, confirmando en la intervención quirúrgica una torsión aguda del bazo.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: drhogul@gmail.com (H. Ogul).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2017.05.011>

0009-739X/© 2017 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.