



La imagen del mes

Aneurisma de bypass de vena safena interna tras revascularización infrainguinal

Saphenous vein graft aneurysm after infrainguinal revascularization

Sara Busto Suárez*, Margarita Rivas Dominguez, Ahmad Amer Zanabali Al-Sibbai y Manuel Alonso Pérez

Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España




Figura 1




Figura 2

Varón de 79 años con antecedentes de tabaquismo, fibrilación auricular e hipertensión arterial. Intervenido de *bypass* fémoro-poplíteo a tercera porción con vena safena interna *in situ* en miembro inferior izquierdo por dolor en reposo.

Diez años más tarde acude a urgencias por masa pulsátil en muslo izquierdo. La eco-Doppler demuestra un aneurisma sacular verdadero del *bypass* de vena de 3,7 cm de diámetro, confirmándose este hallazgo en la angiotomografía computarizada (fig. 1).

La reparación quirúrgica se realizó mediante resección del segmento aneurismático y sustitución por parche de arteria femoral superficial endarterectomizada (fig. 2).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: sarabusto9@gmail.com (S. Busto Suárez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2018.10.003>

0009-739X/© 2018 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.