

La imagen del mes

Obstrucción intestinal secundaria a hernia de Morgagni bilateral

Intestinal obstruction due to a bilateral Morgagni hernia



Nefeli Yagüe Rigopoulou*, Cristina Alegre Torrado y Alberto Marcacuzco Quinto

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España




Figura 1

Mujer de 87 años, con cuadro compatible con obstrucción intestinal de 48 h de evolución. Se realiza una TAC abdominal que muestra una hernia diafragmática anterior obstructiva (fig. 1A y B), conteniendo colon en su interior. Se realiza intervención quirúrgica urgente, objetivándose un doble defecto herniario (fig. 1C) en el diafragma anterior, conteniendo el colon transverso y realizándose una reparación de ambos defectos.

La hernia de Morgagni es una enfermedad infrecuente y generalmente asintomática. El 8% de estas son bilaterales y pueden causar complicaciones respiratorias o digestivas.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: nefeliyague@gmail.com (N. Yagüe Rigopoulou).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2019.02.009>

0009-739X/© 2019 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.