




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia


La imagen del mes

Infiltraciones calcificadas difusas de la vía biliar intrahepática: metástasis de adenocarcinoma mucinoso

Diffuse calcificated infiltrations of the intrahepatic bile duct: Metastasis of mucinous adenocarcinoma

Pol Guarner^a, Lucía Garrido^{a,b}, Dulce Momblán^{a,*} y Antonio M. Lacy^a

^aServicio de Cirugía Gastrointestinal, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España

^bServicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra, España



Figura 1

Paciente de 59 años con antecedente de adenocarcinoma de colon tratado mediante resección segmentaria de ángulo esplénico en 2012. Anatomía patológica: células en anillo de sello y 40% componente mucinoso (estadio-IIIc: T4aN2bM0). Quimioterapia FOLFOX adyuvante.

Posterior recidiva ganglionar tratada con neoadyuvancia (folfiri-bevacizumab), linfadenectomía de territorios interaortocava y celiaco (8/11 afectos), y adyuvancia (capecitabina).

En 2015 se diagnosticó recidiva hilar hepática que infiltraba la vía biliar intrahepática (calcificaciones difusas indicativas de metástasis de origen mucinoso [fig. 1]), que requirió la colocación de 2 prótesis biliares por colestasis obstructiva.

La enfermedad ha progresado y el paciente ha precisado cirugía gástrica derivativa por obstrucción duodenal y múltiples recambios de prótesis biliares.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: dmomblan@clinic.cat (D. Momblán).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2019.03.019>

0009-739X/© 2019 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.