

La imagen del mes

Gammagrafía con hematíes desnaturalizados en esplenosis hepática en paciente con cirrosis



Labeled heat-denatured red blood cell scintigraphy in hepatic splenosis in a cirrhotic patient

Juan José Martín-Marcuarta^{*}, Paula Fernández-Rodríguez, Juan Luis Tirado-Hospital y José Manuel Jiménez-Hoyuela

Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España




Figura 1

Varón de 66 años con antecedentes de esplenectomía y cirrosis crónica. Durante el estudio pretrasplante se halla una lesión ocupante de espacio en segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo, sospechosa de malignidad y múltiples lesiones mesentéricas. Para descartar implantes tumorales que contraindicaría el trasplante, y ante la sospecha de esplenosis mesentérica se hizo una gammagrafía con hematíes desnaturalizados que confirmó no solo la existencia de esplenosis mesentérica (figs. 1a y b, punta de flecha azules) sino la presencia de tejido esplénico intrahepático (fig. 1b, punta de flecha roja). El paciente pudo ser trasplantado y se confirmó histológicamente tras la cirugía el diagnóstico de esplenosis intrahepática.

^{*} Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ghinzu85@gmail.com (J.J. Martín-Marcuarta).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2019.04.014>

0009-739X/© 2019 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.