

La imagen del mes

Perforación orofaríngea secundaria a la colocación de una sonda nasogástrica

Oropharyngeal perforation secondary to nasogastric tube placement

Ester Ferrer-Inaebnit^{a,*}, Jaume Bonnin-Pascual^a, Cristina Pineño-Flores^{a,b}
y Xavier González-Argente^{a,b,c}

^aServicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Son Espases, Palma, Mallorca, España

^bInstituto de Investigación Sanitaria de Islas Baleares (IdISBa), Palma, Mallorca, España

^cFacultad de Medicina, Universidad de las Islas Baleares, Palma, Mallorca, España




Figura 1



Figura 2

Varón de 46 años, con historia de múltiples intervenciones abdominales, ingresado por oclusión intestinal. Se coloca sonda nasogástrica (SNG) que inicialmente no es productiva. Se solicita tomografía tóraco-abdominal por empeoramiento clínico, observándose un trayecto extraluminal de la SNG a nivel abdominal y torácico (fig. 1) sin hallar punto de perforación, y que se orienta como probable perforación a nivel cervical (fig. 2). La exploración ORL identifica la perforación en cavum inferior, disecando la pared posterior de la faringe. Se retira la SNG, y se inicia tratamiento médico con corticoides, fluconazol y meropenem. El paciente presenta mejoría clínica radiológica e inicia tolerancia oral a la semana.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: esterinaebnit@gmail.com (E. Ferrer-Inaebnit).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.10.009>

0009-739X/© 2020 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.