




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



La imagen del mes

Herniación abdominal primaria de quiste hepático

Primary abdominal herniation of hepatic cyst

Belén Conde Inarejos*, Antonio Serafín Valero Liñán, Jose Antonio González Masiá y Jose Ignacio Miota de Llama

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España




Figura 1

Mujer de 86 años con antecedentes de DM2, HTA, insuficiencia cardíaca severa y FA, anticoagulada con acenocumarol, acude a urgencias por tumoración abdominal no dolorosa y sin signos de infección, localizada en hipocondrio derecho, sin antecedente traumático ni cirugía previa. Analítica: leucocitosis 23.000 con neutrofilia 85%, actividad de protrombina 15% e INR 4,5. La TAC abdominal: lesión quística perihepática anterior de $15 \times 15 \times 8,5$ cm, polilobulada y que atraviesa la pared abdominal anterolateral derecha, sin signos de complicación ni sangrado (fig. 1). Se propone fenestración quística más hernioplastia laparoscópica que la paciente, por edad y comorbilidad, rechaza. Se decide seguimiento ambulatorio. Diagnóstico: quiste hepático gigante herniado a través de defecto primario de pared abdominal anterolateral derecha.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: bciconde@gmail.com (B. Conde Inarejos).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2021.02.002>

0009-739X/© 2021 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.