



La imagen del mes

Síndrome del Bodypacker

Body packer's syndrome

Itziar de Ariño Hervás, Lorena Arrabal Agüera ^{*}, Miren Josebe Padilla Otamendi y Araceli Rodríguez González

Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Donostia. Osakidetza, San Sebastián / Donostia, España



Figura 1



Figura 2

Varón de 53 años que es traído a Urgencias por desorientación y agitación. Presenta discurso incoherente, fuga de ideas y alucinaciones. Se realiza medición de tóxicos en orina, siendo positivo a benzodiacepinas y a cocaína. Realiza pico febril, así como agitación progresiva, por lo que se solicita radiografía de tórax y abdomen, con hallazgo de distensión de la cámara gástrica con múltiples imágenes tubulares en su interior. Se realiza TAC anteroposterior (figs. 1-2) e ingresa para un control evolutivo. Ante el empeoramiento progresivo y los síntomas de intoxicación grave, entidad conocida como síndrome del Bodypacker, requiere laparotomía urgente para la extracción de las bolsas de droga.

Financiación

No procede.

Conflictos de intereses

Declaramos no tener conflicto de intereses.

^{*} Autor para correspondencia.

Correo electrónico: lorena.arrabalagueera@osakidetza.eus (L. Arrabal Agüera).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.03.003>

0009-739X/© 2022 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

