



La imagen del mes

Paraganglioma extraadrenal: tumor mesentérico de origen infrecuente



Extra-adrenal paraganglioma: Mesenteric tumour of uncommon origin

Álvaro Soler-Silva, María Cabezas, Ibán Caravaca García y Alicia Calero*

Cirugía General del Hospital General Universitario de Elche, Alicante, España




Figura 1

Se remite una mujer de 55 años desde ginecología a cirugía general, tras revisión ginecológica anual, para la valoración quirúrgica de una tumoración intraabdominal asintomática, localizada en la región hipogástrica. Se realiza estudio de extensión mediante tomografía computarizada abdominopélvica (fig. 1 A), confirmando una masa pélvica hipervascularizada sugestiva de un tumor primario sólido de origen mesentérico de $7 \times 8 \times 6$ cm, sin infiltración intestinal ni afectación a distancia. Tras la cirugía de resección local (fig. 1 B) el estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico definitivo de paraganglioma extraadrenal de localización atípica (fig. 1 C), requiriendo controles de por vida con niveles de cromogranina A, debido a su riesgo de malignización.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: alidoc20@yahoo.es (A. Calero)

Twitter Icon (A. Calero).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.03.006>

0009-739X/© 2022 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.