




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



La imagen del mes

Úlcera de Marjolin por mielomeningocele congénito

Marjolin's ulcer due to congenital myelomeningocele



Ester Alonso Batanero*, Miguel Ángel Díaz Rivero, Harold Jaime Vargas Pierola y Consuelo Rocío Menéndez Dizy

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Valle del Nalón, Langreo, Asturias, España



Figura 1




Figura 2

Varón de 67 años con mielomeningocele congénito y fístulas sacras de 30 años de evolución. Ingresa por fiebre, edema de pierna izquierda, úlcera sacrococcígea con fistulizaciones isquiorrectales (fig. 1), osteomielitis izquierda (fig. 2, flecha) y bloques adenopáticos inguinales (fig. 2, asteriscos).

Tras el desbridamiento y la toma de biopsias se diagnostica de neoplasia escamosa infiltrante bien diferenciada, y por tomografía computarizada, de metástasis óseas, pulmonares y hepáticas, falleciendo en el mismo ingreso.

La úlcera de Marjolin, o degeneración maligna de zonas de inflamación crónica, consiste en neoplasias de rápida evolución y mal pronóstico presentes en el 0,5% de pacientes con lesiones medulares. La cirugía con intención curativa es escasa y consiste en resecciones amplias de partes blandas y musculoesqueléticas.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses ni económico, ni profesional ni personal de ninguno de los autores.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: estherab91@gmail.com (E. Alonso Batanero).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.03.007>

0009-739X/© 2022 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.