



## Video del mes

# Intervención quirúrgica de fistula transesfintérica anterior mediante técnica LIFT

## Surgical intervention of anterior transsphincteric fistula using lift technique



Ester Ferrer-Inaebnit<sup>a</sup>, Natalia Pujol Cano<sup>a</sup>, Álvaro García-Granero García-Fuster<sup>a,b,\*</sup>  
y Xavier González Argenté<sup>a,b</sup>

<sup>a</sup> Departamento de Cirugía General, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, España

<sup>b</sup> Facultad de Medicina, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España



Figura 1

Mujer de 25 años con antecedente de tutorización de fistula transesfinteriana anterior con setón. Durante el seguimiento, se realiza una ecografía endoanal que objetiva un orificio fistuloso externo (OFE) anterolateral con trayecto curvo hacia un orificio interno (OFI) en la línea dentada anterior, abarcando el 30% del esfínter anal externo figura 1.

Se decide intervención quirúrgica mediante técnica de ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso (LIFT). Esta técnica se basa en identificación, ligadura y sección del trayecto fistuloso en el espacio interesfintérico.

Tras un seguimiento de 24 meses, la paciente no ha presentado recurrencia de la fistula ni incontinencia anal (Wexner = 0).

## Financiación

Este trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.

## Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2022.08.011](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.08.011).

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [alvaroggf@hotmail.com](mailto:alvaroggf@hotmail.com) (Á. García-Granero García-Fuster).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.08.011>

0009-739X/© 2022 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.