




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



Vídeo del mes

Tratamiento laparoscópico de la hernia inguinal medial M2 con malla autofijable

Laparoscopic treatment of medial inguinal hernia M2 with self-gripping mesh

Montse Pierres*, Marc Cubel, Cristina Muñoz y Carlos Hoyuela

Servicio de Cirugía General, Hospital Fundación Sanitaria Mollet, Mollet del Valles, Barcelona, España

La reparación laparoscópica de hernias mediales (M1-2) se puede realizar ambulatoriamente de forma fácil y segura con mallas autofijables. Su uso permite la fijación atraumática en toda la estructura anatómica con disminución del dolor




Figura 1

postoperatorio y sensación de cuerpo extraño. Este video describe los pasos principales de la reparación laparoscópica (TAPP) de la hernia inguinal, centrándose en cómo desplegar la malla autofijable, evitando la mala posición y el plegamiento. Además, la orientación vertical de la malla asegurará una buena superposición sobre el ligamento de Cooper, evitando una de las principales causas de recurrencia. La preforma de la malla proporciona tridimensionalidad para un mejor acoplamiento a la pared posterior inguinal (fig. 1).

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2023.02.027](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.02.027).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: 26425mpm@gmail.com (M. Pierres).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.02.027>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.