



La imagen del mes

Masa retroperitoneal: un reto diagnóstico

Retroperitoneal mass: A diagnostic challenge



Cristina González Prado*, Fernando Martín Acebes, Marina Manzanera Díaz y Miguel Ángel Álvarez Rico

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España




Figura 1



Figura 2

Paciente de 62 años que consulta por dolor abdominal. Se realiza TAC abdominal (fig. 1a), donde se observa una masa hepatoduodenal. Se complementa el estudio con una RM hepática, en la cual se aprecia una masa tumoral en el ligamento hepatoduodenal dependiente de la 2.^a porción duodenal, y una ecoendoscopia con toma de biopsias describiéndose una tumoración de la encrucijada biliopancreática con anatomía patológica (AP) de proliferación neoplásica mesenquimal. Se decide la intervención quirúrgica, en la cual se observa una tumoración originada en la vena cava inferior yuxtarenal (fig. 1b), realizándose exéresis y plastia con parche de pericardio bovino. La AP confirma leiomioma de vena cava inferior.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: Cristinagonpra21@gmail.com (C. González Prado).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.03.015>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.