



La imagen del mes

Síndrome de Wunderlich: importancia de un diagnóstico precoz

Wunderlich syndrome: The importance of an early diagnosis

Rafael C. Recio-Bermejo^{a,*}, Sofía Afonso Domínguez^a, Cristina Cobo Vázquez^b
y Andrés Francisco Zazo Romojaro^a

^a Servicio de Urología, Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España

^b Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España



Figura 1

Mujer de 73 años hipertensa, en tratamiento con edoxabán, que consultó por dolor agudo en flanco derecho sin traumatismo previo, estable, taquicárdica, con abdomen normal salvo puñopercusión renal derecha positiva. Presentaba 21.200 leucocitos y TP 45. Ecográficamente, mostraba gran hematoma subcapsular renal, realizándose TAC (fig. 1) con hematoma agudo, afectación subcapsular extensa ($20 \times 3,2$ cm) y extravasación de contraste, sugestivo de síndrome de Wunderlich. Fue tratada exitosamente con embolización selectiva, con TAC control con resolución completa a los 3 meses. Es una entidad infrecuente, pero potencialmente mortal que requiere un diagnóstico y un manejo precoz, con etiología neoplásica en $> 60\%$.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: rafarecberm@gmail.com (R.C. Recio-Bermejo).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.06.002>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.