



La imagen del mes

Neumatosis intestinal quística: un hallazgo incidental e infrecuente

Intestinal cystic pneumatosis: A case report


Ruth López González^{a,*}, Daniel Rolando Coronado^a, Carolina Barrera^b y Jordi Castellví^a^a Servicio de Cirugía General, Consorci Sanitari Integral, Barcelona, España^b Servicio de Anatomía Patológica, Consorci Sanitari Integral, Barcelona, España

Figura 1




Figura 2

Varón de 67 años al que se realiza colonoscopia por test de sangre oculta en heces positiva. Se evidencian lesiones quísticas a 30 cm de margen anal (fig. 1). La biopsia es compatible con leiomiomatosis. Se realiza estudio de extensión con TAC toracoabdominal (fig. 2).

Finalmente, tras exéresis y análisis de la pieza quirúrgica, se evidencia neumatosis quística intestinal.

La neumatosis quística intestinal es una entidad benigna e infrecuente de etiología desconocida y caracterizada por formaciones quísticas submucosas. Se presenta de forma incidental y los pacientes suelen estar asintomáticos. No requiere tratamiento quirúrgico, aunque puede presentarse como abdomen agudo por neumoperitoneo.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ruthlopez013@gmail.com (R. López González).<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.08.008>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.