



La imagen del mes

Diagnóstico diferencial de tumor retroperitoneal: hematoma crónico suprarrenal, un diagnóstico infrecuente



Differential diagnosis of retroperitoneal tumor: Chronic adrenal hematoma, an uncommon diagnosis

Álvaro Soler-Silva*, Verónica Aranaz-Ostáriz, Sandra Lario Pérez y José Antonio Barreras

Departamento de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital General Universitario de Elche, Alicante, España




Figura 1

Los tumores retroperitoneales constituyen un grupo de lesiones que pueden presentarse con síntomas inespecíficos, dificultando su diagnóstico. Entre los más frecuentes destacan los liposarcomas, derivados de células grasas; los GIST, causados por tejido conectivo del tracto gastrointestinal; los rhabdomyosarcomas, a partir de células musculares embrionarias; los renales y suprarrenales; y los neurogénicos, como el neuroblastoma o schwannoma. Presentamos un tumor retroperitoneal (fig. 1) en un varón de 79 años, sospechoso de liposarcoma, con clínica de dispepsia funcional de tres meses de evolución, sin antecedentes traumáticos, cuya biopsia por aguja gruesa no fue rentable. Tras una cirugía no compartimental, según los deseos del paciente, el estudio patológico describió un hematoma crónico secundario a una hemorragia de la glándula suprarrenal izquierda, un diagnóstico infrecuente a destacar.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: soler.medi@gmail.com (Á. Soler-Silva).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.09.005>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.