



La imagen del mes

Cornada envainada: una lesión por asta de toro infrecuente



Sheathed goring: An unusual bull-horn injury

Ana Benítez Riesco^{*}, María del Carmen Fernández Moreno, Claudia Gil Alfosea y David Casado Rodrigo

Servicio de Cirugía General, Hospital Clínico de Valencia, Valencia, España



Figura 1




Figura 2




Figura 3

Varón de 44 años remitido tras sufrir contusiones por asta de toro. Refería dolor abdominal. Estable hemodinámicamente, presentaba contusión en hipocondrio derecho con evisceración palpable y piel íntegra (fig. 1). La TC urgente describe evisceración y rarefacción periduodenal (fig. 2). Se realiza cirugía urgente, evidenciando evisceración de intestino delgado en hipocondrio derecho por defecto de 10 cm con laceración mesentérica (fig. 3), y se repara la lesión mediante cierre primario y malla retromuscular. Postoperatorio sin incidencias y seguimiento sin recidiva herniaria.

La cornada envainada supone < 2% de las heridas abdominales por asta de toro y requiere un alto índice de sospecha.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

^{*} Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ana.br94@gmail.com (A. Benítez Riesco).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.10.013>

0009-739X/© 2024 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.