

La imagen del mes

Carcinoma pulmonar asociado a quiste aéreo: importancia del seguimiento para el diagnóstico temprano

Lung cancer associated to cystic airspaces: Surveillance for early diagnosis

Julio Ricardo Torres Bermúdez ^{a,*}, Cora Andrea Sampedro Salinas ^a, Sonia Gatus Calderó ^b y Carlos A. Rombolá ^a

^aServicio de Cirugía Torácica, Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España

^bServicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Arnau Vilanova, Lleida, España




Figura 1




Figura 2

El cáncer pulmonar asociado a quistes aéreos es poco frecuente. Algunos especialistas no asocian esta morfología al cáncer pulmonar, lo que lleva a un retraso en el diagnóstico. Presentamos el caso de una mujer de 64 años fumadora y con EPOC. En una primera TC aparece una lesión quística de 4 cm en el lóbulo inferior izquierdo. En otra TC de control realizada 3 años después aparece un nódulo exofítico de 3 cm (Mascalchi tipo I) (fig. 1). Se realiza una lobectomía inferior izquierda. El informe patológico es compatible con carcinoma neuroendocrino de células grandes en estadio (Ib. pT2aN0Mx) (fig. 2).

Conflicto de intereses

Ninguno.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: ricardo970sigma@yahoo.com (J.R. Torres Bermúdez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.10.014>

0009-739X/© 2023 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.