



La imagen del mes

Shock hemorrágico por causa poco frecuente: varices yeyunales

Hemorrhagic shock due to a rare cause: Jejunal varices

Gema Martínez Izquierdo*, Ana Belén Menéndez Corteguera, Sandra Sanz Navarro y Lourdes Sanz Álvarez

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España



Figura 1




Figura 2

Mujer de 41 años con antecedentes de obesidad y aborto espontáneo, que ingresa en UCI por rectorragias y anemia con nulo rendimiento transfusional. Se realizan colonoscopia y gastroscopia, sin objetivar punto de sangrado, pero sí restos hemáticos frescos. La tomografía muestra abundantes varices de yeyuno proximal (fig. 1), compatible con hipertensión portal, secundaria a trombosis crónica de la vena mesentérica superior (fig. 2).

Se realiza laparotomía urgente objetivando venas tortuosas y dilatadas en los primeros 60 centímetros de intestino delgado, resecándose hasta tercera porción duodenal y se coloca dispositivo de vacío para *second look*. A las 72 horas se realiza anastomosis duodeno-yeyunal.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: gmizquierdo4@gmail.com (G. Martínez Izquierdo).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.08.010>

0009-739X/© 2024 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.