



La imagen del mes

Neurofibroma del nervio vago como hallazgo incidental durante linfadenectomía laterocervical por cáncer papilar de tiroides

Neurofibroma of the vagus nerve as an incidental finding during left modified radical neck dissection for papillary thyroid cancer

Aitor Redondo Expósito^{a,*}, María Pilar Salvador Egea^a, Cristina Erce García^a
y Alfonso Vázquez Miguez^b

^a Sección de Cirugía Endocrina, Área de Gestión Clínica de Cirugía General, Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, Navarra, España

^b Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, Navarra, España




Figura 1

Durante el transcurso de una linfadenectomía cervical lateral izquierda por cáncer papilar de tiroides se objetiva que uno de los ganglios, informado en la TAC preoperatoria como localizado entre la carótida y la yugular izquierdas (fig. 1), resulta ser una formación dependiente del nervio vago. El neurocirujano lo identifica intraoperatoriamente como un neurofibroma del vago y recomienda actitud expectante dado que no produce clínica y su resección implicaría déficits funcionales importantes. Los neurofibromas son tumores de crecimiento lento derivados de la vaina neural que, a diferencia de los schwannomas, que tienen un crecimiento exofítico, crecen en el espesor del nervio.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: aredexp@gmail.com (A. Redondo Expósito).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2023.12.003>

0009-739X/© 2024 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.