




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



La imagen del mes

Fusión hepatolienal, un hallazgo extremadamente infrecuente



Hepatosplenic fusion: an extremely rare finding

Daniel Humaran Cozar ^{a,*}, María Galofré Recasens ^a, Oriol Busquets Carrera ^b
y Ana Torres Marí ^a

^a Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

^b Radiología, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España




Figura 1

Mujer de 56 años, sin antecedentes patológicos y a la que se le realiza una tomografía computarizada (TC) abdominal para estudio de un cuadro oclusivo intestinal. En dicha exploración se aprecia incidentalmente una total continuidad anatómica entre el lóbulo hepático izquierdo y el bazo, visualizándose adecuadamente el hilio esplénico y la llegada de la vena suprahepática izquierda al bazo (fig. 1). Esta anomalía anatómica se denomina fusión hepatolienal (de lien, bazo en griego), es extremadamente infrecuente y asintomática, siendo descrita por primera vez en una autopsia en 1978 por Cotelingam et al., y documentada en la literatura en escasas ocasiones.

Conflicto de intereses

Ninguno.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: dhumaran19@gmail.com (D. Humaran Cozar).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2024.01.010>

0009-739X/© 2024 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.