



Video del mes

Tratamiento quirúrgico del síndrome del ligamento arcuato medio (SLAM) mediante plataforma robótica



Surgical treatment of the Median Arcuate Ligament Syndrome (MALS) using robotic platform

Anna Vidal Carné*, Alba Zárate Pinedo, Sara Sentí Farrarons y Esteban Cugat Andorrà

Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España




Figura 1

Varón de 55 años sin antecedentes previos, sometido a estudio por dolor abdominal de predominio postprandial. Como hallazgo patológico se identifica una estenosis del tronco celíaco (TC) secundaria a una compresión por el ligamento arcuato medio (LAM). Dada la ausencia de otros hallazgos patológicos, se indica liberación quirúrgica del TC.

La intervención se lleva a cabo mediante la plataforma robótica DaVinci Xi (Intuitive Surgical Inc., Silicon Valley, California, Estados Unidos). Tras la apertura de los pilares diafragmáticos, se expone la cara anterior de la aorta y se diseca caudalmente hasta identificar y seccionar las fibras del LAM. El paciente presentó un curso postoperatorio favorable con resolución de la sintomatología [figura 1](#).

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2024.05.015](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2024.05.015).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: anna515vidal@gmail.com (A. Vidal Carné).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2024.05.015>

0009-739X/© 2024 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de AEC.