




CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



La imagen del mes

Esplenopancreatectomía caudal emergente tras traumatismo pancreático cerrado



Emergent distal splenopancreatectomy after blunt pancreatic trauma

Lucía Santos Vieitez*, Aloia Guerreiro Caamaño y Jorge Pérez Grobas

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España




Figura 1

Las lesiones pancreáticas traumáticas son infrecuentes. Los traumatismos de alto impacto con mecanismos de desaceleración suelen ser la causa más frecuente, dada la compresión epigástrica contra la columna vertebral, principalmente secundaria a accidentes automovilísticos. El cuerpo pancreático suele ser el segmento más afectado. Las lesiones pancreáticas aisladas no son comunes y, hasta el 90% se acompañan de otras lesiones.

En esta imagen se identifica una lesión pancreática en región cuerpo/cola, con sección secundaria del conducto pancreático principal asociada sangrado arterial activo, tras un accidente automovilístico, que precisó cirugía urgente, realizando pancreatectomía distal asociada a esplenectomía de necesidad (fig. 1).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: luciasantosvieitez@gmail.com (L. Santos Vieitez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2024.05.018>

0009-739X/© 2024 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de AEC.