

Hernia vesical

Rijo Mora EA, Vallmanya Llena FR, Hernández Pozo H, Del Canto Aguirre M, Lorente Garín JA, Gelabert Mas A.

Servicio y Cátedra de Urología. Hospital del Mar. Universidad Autónoma de Barcelona.

Actas Urol Esp. 2007;31(8):938

Varón de 67 años remitido al Servicio de Urología por masa escrotal indolora de larga evolución. El paciente refería micción en dos tiempos

- a) espontánea
- b) a la compresión escrotal.

Exploración física: Aumento de tamaño de hemiescroto derecho por hernia inguino-escrotal. Tras la manipulación del saco herniario el paciente refirió necesidad de micción. Se realizó cistografía (Fig. 1) donde se evidenció hernia vesical derecha.

Tras incisión de Gregoire ampliada se objetiva hernia inguino-escrotal directa con deslizamiento de la vejiga urinaria e intestino, que se corrige con 2 mallas según técnica de Lichtenstein.

Correspondencia autor: Dr. E.A. Rijo Mora

Servicio de Urología. Hospital del Mar

Passeig Marítim, 25-29 - 08003 Barcelona

Tel.: 932 483 000

E-mail autor: rijo_enrique@yahoo.es

Información artículo: Imágenes en Urología

Trabajo recibido: septiembre 2006

Trabajo aceptado: octubre 2006

FIGURA 1