



Endocrinología y Nutrición



276 - ESTUDIO DUAL IV: IDEGLIRA EN PACIENTES CON DM2 NO CONTROLADA EN TRATAMIENTO CON SULFONILUREAS (SU) EN MONOTERAPIA O COMBINADAS CON METFORMINA NO TRATADOS PREVIAMENTE CON INSULINA

A. Soto^a, H.W. Rodbard^b, S.B. Harris^c, L. Rose^d, L. Lehmann^e, H. Jarlov^e y J. Thurman^f

^aEndocrinología. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. España. ^bEndocrine and Metabolic Consultants. Rockville. EEUU. ^cFamily Medicine. University of Western Ontario. London. Reino Unido. ^dDiabetology. Institut für Diabetesforschung. Münster. Alemania. ^eNovo Nordisk. Søborg. Dinamarca. ^fEndocrinology. SSM Medical Group. Saint Charles. EEUU.

Resumen

Introducción: En este ensayo multinacional, doble ciego, de 26 semanas de duración, se analizó la combinación de degludec/liraglutida (IDegLira) en adultos ($n = 435$) con DM2 (HbA_{1c} 7,0–9,0%).

Métodos: Se aleatorizó 2:1 a los pacientes a recibir IDegLira 1 vez/día o placebo añadidos a SU ± metformina. La dosis inicial fue de 10 unidades de dosis (10 unidades IDeg/0,36 mg Lira), ajustándola hasta alcanzar un objetivo glucémico en ayunas de 72–108 mg/dl.

Resultados: Los valores medios de HbA_{1c} se redujeron del 7,9% (ambos grupos) al 6,4% con IDegLira y al 7,4% con placebo, con una diferencia estimada del 1,02% ($p < 0,001$). Se alcanzó una HbA_{1c} 7% en el 79,2% de los pacientes que recibieron IDegLira vs el 28,8% de los que recibieron placebo, $p < 0,001$ (para $HbA_{1c} \geq 6,5\%$: 64,0% vs 12,3%, $p < 0,001$). La glucemia media en ayunas se redujo de 164 mg/dl (ambos grupos) a 117 mg/dl con IDegLira y a 159 mg/dl con placebo (diferencia estimada 41,4 mg/dl, $p < 0,001$). A las 26 semanas, el perfil medio de glucemia autodeterminada de 9 puntos se redujo en 39,6 vs 12,6 mg/dl con IDegLira y placebo, respectivamente, con una diferencia estimada en la glucosa media de 27,9 mg/dl, $p < 0,001$. La glucemia fue significativamente inferior con IDegLira en los 9 puntos (análisis a posteriori). La dosis media de IDegLira a las 26 semanas fue de 28 unidades de dosis (28 unidades IDeg/1,0 mg Lira). Se observaron casos de hipoglucemia confirmada (grave o glucosa plasmática 56 mg/dl) en el 41,7% y 17,1% de los pacientes tratados con IDegLira y placebo, respectivamente, con tasas de 3,5 vs 1,4 eventos/pacientes-año (razón de tasas estimada: 3,74, $p < 0,001$). La variación media de peso fue de +0,5 kg con IDegLira vs -1,0 kg con placebo ($p < 0,001$).

Conclusiones: IDegLira en combinación con SU mejoró significativamente el control glucémico. Tal y como se espera por el uso de SUs, las tasas de hipoglucemia, aunque bajas, fueron más frecuentes que en los ensayos previos donde IDegLira se combinó con otros antidiabéticos orales. El tratamiento se toleró bien, con tasas globales de eventos adversos similares a las observadas en ensayos previos con IDegLira.