



# Endocrinología y Nutrición



## 76 - PÉPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO (VIP) EN PACIENTES CON ENFERMEDAD TIROIDEA AUTOINMUNE (ETAI)

A.M. Ramos-Levi<sup>a</sup>, I.V. Seoane<sup>b</sup>, A. Serrano-Somavilla<sup>a</sup>, R. Martínez-Hernández<sup>a</sup>, M. Sampedro-Núñez<sup>a</sup>, I. Huguet<sup>a</sup>, Y. Juarranz<sup>b</sup>, I. González-Álvaro<sup>c</sup>, R. Gomariz<sup>b</sup> y M. Marazuela<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario de La Princesa. Instituto de Investigación Princesa. Universidad Autónoma de Madrid. España. <sup>b</sup>Departamento de Biología Celular. Facultad de Biología. Universidad Complutense de Madrid. España. <sup>c</sup>Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de la Princesa. Instituto de Investigación Princesa. Universidad Autónoma de Madrid. España.

### Resumen

**Introducción:** Los pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune (ETAI) presentan mecanismos inmunológicos aberrantes. El péptido intestinal vasoactivo (VIP) forma parte del circuito inmuno-neuro-endocrino y tiene propiedades inmuno-reguladoras. Este estudio evalúa los valores plasmáticos de VIP en pacientes con ETAI.

**Métodos:** Se obtuvieron muestras de sangre periférica de 235 pacientes con patología tiroidea (78 tiroiditis de Hashimoto (TH), 144 enfermedad de Graves (EG), 13 hipertiroidismo por causa distinta de EG (NG)) y 49 controles sanos. Se analizaron T4L (RIA), TSH y autoanticuerpos (ensayo inmuno-radiométrico) y VIP (ELISA). Se agruparon los pacientes según diagnóstico, estado bioquímico y tratamientos recibidos. En 73 casos con EG diagnosticada al inicio, se obtuvo una 2<sup>a</sup> muestra para determinar VIP a los 3 meses de antitiroideos. Se tipificaron los valores de VIP para evitar el “efecto lote” de los resultados del ELISA.

**Resultados:** VIP fue menor en los pacientes con EG (334,24 pg/ml) que en controles (364,11 pg/ml), TH (361,42 pg/ml) o NG (363,21 pg/ml) ( $p = 0,003$ ). Se observó una correlación inversa entre T4L y VIP en pacientes con EG ( $B = -7,709, p = 0,021$ ). No se observó correlación entre VIP y anticuerpos antitiroideos en ninguno de los grupos de ETAI. En los pacientes con EG, VIP fue mayor en los que tenían oftalmopatía (342,17 vs 325,29 pg/ml,  $p = 0,083$ ). Los pacientes con EG que habían recibido alguna forma de tratamiento (antitiroideos, I131 o cirugía) presentaron VIP mayor que los que no habían recibido ningún tratamiento (346,64 vs 326,08 pg/ml,  $p = 0,001$ ). En los pacientes con EG con seguimiento tras 3 meses de antitiroideos, VIP no fue significativamente diferente.

**Conclusiones:** VIP está disminuido en pacientes con EG, especialmente en los no tratados y más hipertiroides. Los tratamientos antitiroideos elevan los valores séricos de VIP. Esta molécula inmuno-reguladora puede jugar un papel relevante en la evolución de los pacientes con EG.

**Agradecimientos:** Premio FSEEN jóvenes endocrinios 2014. Proyectos RETICS, RD12/0009/0002, PI12/00758, S2010/BMD-2350. Cofinanciados con fondos FEDER UE.