



Endocrinología y Nutrición



P-103. - Estatinas y riesgo de DM: Análisis de la PRESCRIPCIÓN de Pitavastatina en atención especializada

M.R. Dawid^a, R. Pintor^a, E. Santacruz^a, D. Carrillo^b, M.J. Jiménez^c, F. Arrieta^a y F. Escobar^b

^aHospital Ramón y Cajal, Madrid. ^bHospital Universitario San Cecilio, Granada.

Resumen

Introducción: Recientemente se han publicado las recomendaciones del Grupo de Trabajo Diabetes y Enfermedad Cardiovascular de la Sociedad Española de Diabetes (SED, 2014-2015) destacando la importancia del perfil lipídico y el tratamiento hipolipemiante en la DM2 con estatinas siendo la principal herramienta para modificar el RCV debido a la reducción en la concentración de cLDL pese a su potencial efecto diabetogénico, existiendo claras diferencias entre las distintas estatinas.

Objetivos: Conocer la prescripción en Atención Especializada de estatinas y especialmente la de pitavastatina por su reciente comercialización, poder hipolipemiante, no efecto diabetogénico y su poco efecto en la reducción de coenzima Q10.

Material y métodos: Para ello se ha estudiado las dosis diarias definidas (DDD) de estatinas, prescritas en dos hospitales terciarios de diferentes Comunidades Autónomas (Madrid y Andalucía) Hospital Universitario. Ramón y Cajal y el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, analizándose la prescripción de pitavastatina a lo largo de todo el año 2014 en toda el área de influencia de atención especializada de dichos Hospitales. Se utilizó la aplicación informática que utilizan el Servicio Madrileño de Salud farm@madrid/y el Servicio Andaluz de Salud, SAS.

Resultados: La estatina que más se prescribe es la atorvastatina (66,9%), seguida de rosuvastatina (13,3%), simvastatina (11,8%), pitavastatina (4,9%), fluvastatina (0,3%) y lovastatina (0,2%). Los servicios que más prescriben estatinas son Cardiología, Endocrinología y Nutrición y Medicina Interna. Cuando analizamos la prescripción de pitavastatina el Servicio que más la prescribe en el H.U. San Cecilio fue Endocrinología y Nutrición y en el área de influencia del H.U. Ramón y Cajal el servicio de Endocrinología y Nutrición fue el segundo que más las prescribió.

Conclusiones: No existen diferencias significativas entre los hospitales del mismo nivel, y de diferente Comunidad Autónoma en la prescripción de estatinas. La pitavastatina es prescrita por los servicios que más estatinas utilizan como son Endocrinología y Nutrición, Cardiología y Medicina interna.