



## IMÁGENES EN UROLOGÍA



### SUSTITUCIÓN COMPLETA DE LA VÍA URINARIA CON ILEON POR TUMOR TRANSICIONAL

Varón. Fumador de 40 cigarrillos al día. Carcinoma urotelial multicéntrico metacrónico.

- Cistectomía - Camey I (1986).
- Pieloureterectomía bilateral con sustitución ileal (1991).
- Uretrectomía y transformación del reservorio ortotópico Camey I en derivación cutánea no contínente a FID (1993).
- Extirpación de pelvis renal izquierda (1994).
- Nefrectomía derecha y linfadenectomía locoregional (1995).

La iconografía presentada (Figs. 1 y 2) corresponde a una pielografía anterógrada por nefrostomía izquierda, realizada al mes de la extirpación de la pelvis renal izquierda (1994): se objetiva paso de contraste al uréter ileal izquierdo, con relleno retrógrado del uréter ileal y de las cavidades intrarenales derechas que mantienen una morfología conservada; asimismo se aprecia relleno de la derivación cutánea.

En ningún momento de su evolución hubo afectación de la función renal ni alteración metabólica. **Exitus a finales de 1995, a la edad de 57 años, falleciendo por extensión metastásica de su proceso neoplásico.**

A. de Pablo Cárdenas, J.I. Jiménez Aristu, M.A. Pinós Paul, J.M. Jiménez Calvo,  
F. Lozano Uruñuela, A.M. Santiago González de Garibay  
Servicio de Urología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona (Navarra).