

*Documentos de la
Comisión de Asistencia
de la SEEN*

Criterios de derivación desde atención primaria a atención especializada de pacientes adultos con enfermedad tiroidea

L. FORGA, R. ASTORGA, R. ALBERO, B. BARCELÓ,
 S. GAZTAMBIDE, J. JOCILES, M. MARÍN, J.A. MATO,
 J. MOREIRO, M.T. MORIES, B. MORENO, C. PESQUERA,
 W. RICART, S. SERRANO, J. SORIANO, J. TÉBAR, E. TORRES,
 C. VÁZQUEZ, J.L. VELASCO Y A. VICENTE

Miembros de la CASEEN.

TIPO DE DERIVACIÓN

Hipotiroidismo	Preferente	Normal	No
Diagnóstico inicial		X	
Hipotiroidismo subclínico		X	
Seguimiento del paciente			X
Dificultad en ajuste de dosis		X	
Hipotiroidismo secundario	X		
Embarazo	X		

Hipertiroidismo	Preferente	Normal	No
Diagnóstico inicial	X		
Seguimiento del paciente		X	
Hipertiroidismo subclínico		X	
Embarazo: antecedente de enfermedad de Graves	X		
Oftalmopatía tiroidea	X		

Bocio normofuncionante	Preferente	Normal	No
Bocio simple, difuso o nodular		X	
Nódulo tiroideo		X	
Crecimiento rápido, bocio doloroso, adenopatías, compresión local	X		
Embarazo	X		

Tiroditis/otros	Preferente	Normal	No
Aguda, subaguda	X		
Anticuerpos antitiroideos positivos			X
Disfunción tiroidea posparto	X		
Dolor tiroideo	X		
Resultado confirmado de tiroxina libre tirotropina discordante	X		
Carcinoma tiroideo	X		

Derivación preferente

- Hipotiroidismo secundario.
- Hipotiroidismo y gestación.
- Hipertiroidismo.
- Embarazo y antecedente de enfermedad de Graves.
- Oftalmopatía tiroidea.
- Bocio de crecimiento rápido, doloroso, con adenopatías o compresión local.
- Embarazo y bocio normofuncionante.
- Tiroiditis aguda.
- Tiroiditis subaguda.
- Disfunción tiroidea posparto.
- Dolor tiroideo.
- Resultado confirmado de T4L/TSH discordantes.
- Carcinoma tiroideo.

Derivación normal

- Hipotiroidismo e hipotiroidismo subclínico, en el diagnóstico.
- Dificultad de ajuste de dosis en el paciente hipotiroido.
- Hipertiroidismo subclínico.
- Bocio simple, difuso o nodular.
- Nódulo tiroideo.