

IMAGEN DEL MES

Nódulo de la hermana María José

Sister Mary Joseph' nodule

A. Miranda*, M. Alves, F. Lopes y T. Fonseca



Serviço de Medicina IIIA, Hospital Pulido Valente, Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Lisboa, Portugal

Recibido el 7 de diciembre de 2013; aceptado el 31 de diciembre de 2013

Disponible en Internet el 7 de febrero de 2014




Figura 1

Mujer de 77 años que consulta por dolor umbilical. Cinco años antes había sido diagnosticada de adenocarcinoma ovárico bilateral en estadio IV con carcinomatosis peritoneal. Fue tratada con quimioterapia neoadyuvante, histerectomía con anexectomía bilateral y quimioterapia posterior. La tomografía computarizada (TC) abdominal, realizada 6 meses antes, no mostraba recidiva local ni ascitis. Presentaba distensión abdominal con ascitis y una masa en región umbilical (fig. 1A, estrella blanca). Una nueva TC abdominal mostraba una masa peritoneal que infiltraba el ombligo (fig. 1B, estrella blanca). La biopsia umbilical mostró la presencia de metástasis de carcinoma seroso papilar del ovario.

Las metástasis cutáneas localizadas en el ombligo son conocidas como «nódulo de la hermana María José», son poco frecuentes, suelen asociarse a neoplasias

gastrointestinales u ováricas y conllevan un pronóstico ominoso. La hermana María José (1856-1939), trabajaba en 1889 en el Hospital St. Mary', una dependencia de la Clínica Mayo actual, cuando llamó la atención al Dr. William W. Mayo Jr. sobre la presencia de un nódulo umbilical en una paciente con una neoplasia umbilical^{1,2}.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Schwartz IS. Sister (Mary?) Joseph' nodule. *N Eng J Med.* 1987;316:1348-9.
2. Fratellone PM, Holowecki MA. Forgotten node: A case report. *World J Gastroenterol.* 2009;15:4974-5.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: anamiranda.83@gmail.com (A. Miranda).