

IMAGEN DEL MES

Úlcera cutánea en paciente con artritis reumatoide Cutaneous ulcer in a patient with rheumatoid arthritis



M.A. Ballester-Martínez*, P. González-Muñoz, E. Muñoz-Zato y P. Jaén-Olasolo

Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España



Figura 1

Varón de 57 años con artritis reumatoide en tratamiento con leflunomida y deflazacort, que consultó por una úlcera cutánea dolorosa en región pretibial derecha, de inicio espontáneo hacía 15 días. La úlcera estaba bien delimitada, redondeada, de fondo fibrinoso y bordes violáceos sobrelevados, y medía 5 cm de diámetro (fig. 1). La biopsia cutánea mostró abundantes neutrófilos en dermis, sin vasculitis asociada, con cultivo negativo para bacterias, hongos y micobacterias. Con el diagnóstico de pioderma gangrenoso se inició tratamiento con prednisona 1 mg/kg/día y tacrolimus tópico con excelente respuesta. El estudio complementario no reveló neoplasia asociada. El pioderma gangrenoso se manifiesta como una úlcera cutánea dolorosa de crecimiento progresivo. Debe descartarse su asociación a neoplasia y enfermedad autoinmune subyacente. En su

tratamiento se han empleado corticoides y otros inmunosupresores, y deben evitarse las manipulaciones quirúrgicas agresivas por el fenómeno de patergia asociado¹.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Pereira N, Brites MM, Gonçalo M, Tellechea O, Figueiredo A. Pyoderma gangrenosum-a review of 24 cases observed over 10 years. *Int J Dermatol.* 2013 Aug;52:938-45.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: asun.ballester@gmail.com (M.A. Ballester-Martínez).