



ELSEVIER

# Revista Clínica Española

[www.elsevier.es/rce](http://www.elsevier.es/rce)



## UNA IMAGEN PARA UN DIAGNÓSTICO

### Nódulo umbilical

### Umbilical nodule

N. Valdeolivas-Casillas\*, A. Cabrera-Hernández y A. García-Duarte

Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, España

Disponible en Internet el 18 de febrero de 2015

Varón de 54 años diagnosticado hace un año de adenocarcinoma rectal con afectación hepática y peritoneal, consulta por una neoformación de 2 meses de evolución, mamelonada, de consistencia friable e infiltrada en región umbilical sin otra sintomatología sistémica acompañante (fig. 1). Se encuentra en tratamiento con el 12.º ciclo de

quimioterapia pese a haber obtenido una respuesta completa peritoneal y una estabilización hepática al 6.º ciclo. El examen histológico muestra una dermis con numerosas formaciones glandulares constituidas por células poligonales y cilíndricas con moco en su interior, con núcleos pleomórficos e hiperchromáticos, y con presencia de nucléolos.



Figura 1

#### Diagnóstico diferencial:

1. Melanoma nodular.
2. Carcinoma epidermoide.

3. Hernia umbilical.
4. Metástasis de un tumor primario no cutáneo.
5. Sarcoma.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [n.valdeolivas@gmail.com](mailto:n.valdeolivas@gmail.com)  
(N. Valdeolivas-Casillas).

#### Anexo. Material adicional

Respuesta correcta en: [doi:10.1016/j.rce.2015.01.004](https://doi.org/10.1016/j.rce.2015.01.004).