



Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

www.elsevier.es/eimc



Fe de errores

Fe de errores de «Lectura interpretada del antibiograma: una necesidad clínica»

Erratum of «Lectura interpretada del antibiograma: una necesidad clínica»

Rafael Cantón

Servicio de Microbiología, Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España

En el artículo «Lectura interpretada del antibiograma: una necesidad clínica» (Enferm Infecc Clin. 2010;28[6]:375-385), se ha detectado un error en varios fenotipos de la [tabla 2](#). A continuación publicamos la [tabla 2](#) correcta.

Tabla 2

Ejemplos de fenotipos raros e imposibles y que requieren confirmación de la identificación o del fenotipo.

Antibiótico o fenotipo	Microorganismo
Penicilina ^R	Estreptococos β-hemolíticos
Ampicilina ^S o ceftioxitina ^S	<i>Klebsiella</i> spp., <i>P. vulgaris</i> , <i>E. cloacae</i> , <i>E. aerogenes</i> , <i>C. freundii</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>A. baumannii</i> , <i>S. maltophilia</i>
Ampicilina ^R	<i>E. faecalis</i> , estreptococos β-hemolíticos
Ampicilina ^R , Amox/clav ^S	Enterococos
Cefuroxima ^S	<i>P. vulgaris</i> , <i>Aeromonas</i> spp.
Cefotaxima ^R	<i>H. influenzae</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>M. catharrhalis</i>
Aztreonam ^S	Cocos grampositivos
Imipenem o meropenem ^R	Enterobacterias ^a , <i>H. influenzae</i> , <i>E. faecalis</i>
Oxacilina ^R , cefalosporinas ^S	<i>S. aureus</i> resistente a meticilina
Gentamicina ^R , otros aminoglicósidos ^S	Cocos grampositivos, enterobacterias, <i>P. aeruginosa</i>
Tobramicina ^R , otros aminoglicósidos ^S	Cocos grampositivos, enterobacterias, <i>P. aeruginosa</i>
Gentamicina ^S	<i>Providencia rettgerii</i>
Vancomicina ^R	<i>S. aureus</i> , SCN, <i>S. pneumoniae</i> , estreptococos β-hemolíticos, corinebacterias, <i>C. difficile</i>
Teicoplanina ^R	<i>S. aureus</i> , <i>S. pneumoniae</i> , estreptococos β-hemolíticos, corinebacterias, enterococos (con vancomicina ^S)
Ciprofloxacina ^R	<i>H. influenzae</i> , <i>M. catarrhalis</i>
Nalidixico ^S , ciprofloxacina ^R	Enterobacterias
Nitrofurantoína ^S	<i>Proteus</i> spp., <i>Providencia</i> spp., <i>Acinetobacter</i> spp.
Clindamicina ^R , eritomicina ^S	<i>S. aureus</i> , SCN
Quipristina-dalfopristina ^R	<i>S. aureus</i> , SCN, <i>S. pneumoniae</i> , estreptococos β-hemolíticos, corinebacterias
Linezolid ^R	<i>S. aureus</i> , SCN, <i>S. pneumoniae</i> , Streptococcus β-hemolíticos, enterococos, corinebacterias
Tetraciclina ^S , minociclina ^R	Enterobacterias
Colistina ^R	<i>P. aeruginosa</i> , <i>A. baumannii</i>
Colistina ^S	<i>Proteus</i> spp., <i>M. morganii</i> , <i>Serratia</i> spp., <i>B. cepacia</i> , cocos gram-positivos

R: resistente; S: sensible; SCN: estafilococo coagulasa negativa.

^a En algunos países su incidencia es elevada.

Véase contenido relacionado en DOI: [10.1016/j.eimc.2010.01.001](https://doi.org/10.1016/j.eimc.2010.01.001).