



Gastroenterología y Hepatología



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

171 - VALIDACIÓN AL CASTELLANO DEL CUESTIONARIO RAWL DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL CON SANGRE OCULTA EN HECES

M. Menéndez Rodríguez¹, N. García Morales^{2,3}, J. Garau Ramírez⁴, A. Traver Salvador⁵, Y. Hervás Jiménez⁴, T. Seoane Pillado⁶, N. Pin Vieito^{7,8,9}, P. Vega Villaamil^{7,8}, A. Montes Martínez^{10,11,12} y J. Cubilla^{7,8,9}

¹Centro de Salud de Lavadores, Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, Sergas. ²Servicio de Digestivo, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), Vigo. ³Grupo de Investigación Digestivo, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur), SERGAS-UVIGO, Vigo. ⁴Centro de Salud Auxiliar de Chile, Área Hospital Clínic-Malvarrosa, Valencia. ⁵Centro de Salud Morella, Área de Salud de Vinaroz. ⁶Preventive Medicine and Public Health Unit, Department of Health Sciences, University of A Coruña-INIBIC, A Coruña. ⁷Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Ourense. ⁸Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. ⁹Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Hepáticas y Digestivas, Ourense. ¹⁰Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública. Universidad de Santiago de Compostela. ¹¹Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). ¹²Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

Resumen

Introducción: La supervivencia del cáncer colorrectal (CCR) es del 57% a los 5 años, en parte debido a un diagnóstico tardío por una baja participación en los programas de cribado. Son necesarios instrumentos que analicen las causas de participación. El objetivo de este estudio fue comprobar la validez y consistencia interna de la versión en castellano del cuestionario de Rawl para el cribado de CCR con sangre oculta en heces.

Métodos: Metodología de validación de cuestionarios, realizado en tres centros de salud de Valencia. Se evaluaron las siguientes variables: edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, clase social, consumo de tabaco, alcohol, índice de masa corporal, antecedentes personales y familiares de cáncer.

Resultados: Se estudiaron 408 individuos. La edad media fue de 59,45 (DE 5,17) años. La consistencia interna de todas las variables alcanzó una alfa de Cronbach de 0,796. El alfa de Cronbach de la dimensión beneficios del cribado fue de 0,871 y para la dimensión barreras al cribado fue de 0,817. Los coeficientes de correlación intraclase del test-retest para la dimensión de los beneficios del cribado fue de 0,809 (IC95% 0,606-0,913) y de 0,499 (IC95% 0,126-0,750) para las barreras.

Conclusiones: La versión en castellano del cuestionario Rawl es válido, fiable y reproducible. Con lo que disponemos de un elemento validado en España con el que objetivar barreras y beneficios percibidos en un programa de cribado poblacional.