



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

107 - ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LA CICLOSPORINA EN EL CONTROL INICIAL DEL BROTE MODERADO-GRAVE DE COLITIS ULCEROSA REFRACTARIA A CORTICOIDES Y DE LA NECESIDAD DE COLECTOMÍA A MEDIO Y LARGO PLAZO

Ana Torres Domínguez, Estela Soria López, Francisco José Fernández Pérez, Nuria Fernández Moreno y Ángeles Pérez Aisa

Unidad de Aparato Digestivo, Hospital Costa del Sol, Marbella.

Resumen

Objetivos: Analizar la respuesta clínica y la tasa de colectomía a los 30 días y al año tras el tratamiento con ciclosporina (CyA) en pacientes con brote moderado-grave de colitis ulcerosa (CU) corticorrefractario.

Métodos: Estudio descriptivo multicéntrico retrospectivo de casos de CU moderados-graves tratados con ciclosporina en el Hospital Costa del Sol y Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga entre enero de 1995 y diciembre de 2020. Analizamos edad, sexo, extensión, gravedad, dosis de CyA, remisión y respuesta clínica y endoscópica, así como tasa de colectomías al mes y al año.

Resultados: Se incluyeron 76 pacientes, de ellos 43 (56%) eran varones, con una edad media de 37 años. El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de CU hasta el tratamiento con CyA fue de 21,5 meses. Presentaron colitis extensa el 68,4%, y se catalogaron 60 casos (78,9%) de brote grave y 10 (13,2%) de moderado. Estos estaban previamente en tratamiento con mesalacina (64,5%), azatioprina (14,5%), 6- mercaptopurina (2,6%) y granulocitoaféresis (2,6%). La dosis de CyA iv administrada fue $3 \pm 0,7$ mg/kg/día durante una media de 10,88 días y la dosis de CyA oral fue $263,60 \pm 166,05$ mg/día durante una media de $3 \pm 1,69$ meses. Posteriormente el 61,8% fueron tratados con INM y el 7,9% requirieron tratamiento biológico durante el seguimiento. A los 30 días del inicio de CyA, el 81,6% de los pacientes alcanzaron la respuesta y el 71,1% la remisión clínica, un 6,6% presentaron un nuevo brote, y la tasa de colectomía fue del 14,5%. Al año, el 79,7% permanecían en respuesta clínica, de los cuales el 72,1% estaban en remisión. En ese momento, solo el 26,3% tuvo control endoscópico, presentando el 55% respuesta y el 21,1% remisión endoscópicas. Casi el 30% sufrieron un nuevo brote y la tasa de colectomía al año fue del 26,7%.

Conclusiones: El tratamiento con CyA a dosis medias recomendadas en nuestros pacientes con brote moderado-grave de CU proporcionó resultados clínicos similares a los publicados en la literatura, con tasas de respuesta clínica casi del 80% al año.