



Gastroenterología y Hepatología



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

P-62 - PREVALENCIA, INCIDENCIA Y MORTALIDAD DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL PEDIÁTRICA EN CATALUÑA

Mar Salas Lloparr¹, Eduard Brunet^{1,2}, Inés Loverdos³, Emili Vela^{4,5}, Clara Comalrena de Sobrerau³, Diana García-Tira³, Luigi Melcarne¹, Caridad Pontes^{5,6}, Laura Patricia Llovet¹, Belén García-Sague¹, Luis Enrique Frisancho¹, Sergio Lario¹, María José Ramírez-Lázaro¹, Anna Puy¹, Albert Villoria^{1,3,4}, Xavier Calvet^{1,7,8}, Judith Cortada-Solé¹, Isabel Laucirica¹, Clàudia Torras¹, Andrea Peña-Rosado¹ y Carla de Sàrraga¹

¹Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell. ²CIBERehd, Instituto de Salud Carlos III, Madrid. ³Servicio de Pediatría, Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Hospital Universitario Parc Taulí, Sabadell. ⁴Unidad de Información y Conocimiento, Servicio Catalán de la Salud, Generalitat de Cataluña, Barcelona. ⁵Digitalization for the Sustainability of the Healthcare System (DS3), Sistema de Salut de Catalunya, Barcelona. ⁶Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxicología, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra. ⁷CIBERehd, Instituto de Salud Carlos III, Madrid. ⁸Departamento de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra.

Resumen

Introducción: La epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica (EII-P) ha sido poco estudiada en Europa Occidental, y las tendencias de prevalencia e incidencia de esta enfermedad son en gran parte desconocidas. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia, incidencia y mortalidad de la EII-P en Cataluña entre 2011 y 2023.

Métodos: Se realizó un estudio transversal con datos poblacionales extraídos del Sistema de Vigilancia de Salud de Cataluña de CATSALUT. Se recopilaron datos anuales de prevalencia, incidencia y mortalidad de la EII en pacientes menores de 18 años. Las tasas se ajustaron por edad y sexo y se analizaron globalmente para la EII-P y por separado para la enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa (CU).

Resultados: El número de pacientes con EII-P aumentó de 307 en 2011 a 725 en 2023, con un incremento del 173% en los casos de CU y un 113% en los de EC. La prevalencia de la EII-P pasó de 23 (IC95% 20,5-25,7) a 48,1 (IC95% 44,7-51,7) por cada millón de habitantes, mientras que la incidencia anual se duplicó, pasando de 81 a 168 casos. Aunque el pico de incidencia se registró en 2022, los datos sugieren una estabilización de la curva de incidencia en los últimos años. Durante el período de seguimiento, se detectaron siete defunciones; la tasa de mortalidad fue demasiado baja para permitir un análisis detallado.

Conclusiones: La prevalencia de la EII-P está aumentando significativamente en Cataluña. Se ha observado una tendencia hacia la estabilización de la incidencia, lo que podría indicar que la prevalencia de la EII-P en Cataluña se mantendrá estable en los próximos años.