



# Gastroenterología y Hepatología



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

## O-6 - REQUERIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL E IMPACTO DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO QUIRÚRGICO SOBRE MORTALIDAD POSTOPERATORIA. DATOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE CATALUÑA 2007-2016

M. Guasch<sup>1</sup>, E. Vela<sup>2</sup>, E. Cabré<sup>3,4</sup>, M. Clèries<sup>2</sup>, F. Cañete<sup>3,4</sup>, D. Parès<sup>5</sup>, À. Guarga<sup>6</sup>, J. Troya<sup>5</sup>, M. Mañosa<sup>3,4</sup> y E. Domènech<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup>Servicio de Cirugía Digestiva, Hospital San Jorge, Huesca. <sup>2</sup>Unidad de Formación y Conocimiento; <sup>3</sup>Área de Atención Primaria, Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya. <sup>3</sup>Servicio de Aparato Digestivo; <sup>5</sup>Servicio de Cirugía Digestiva, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. <sup>4</sup>CIBEREHD.

### Resumen

**Introducción:** La cirugía es necesaria en una proporción considerable de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII). A pesar de los avances tecnológicos y farmacológicos, su tasa de morbilidad es elevada en relación a otras cirugías abdominales. Por este motivo, la experiencia del equipo quirúrgico puede ser crítica.

**Objetivos:** Describir las necesidades de cirugía resectiva en la enfermedad de Crohn (EC) y colitis ulcerosa (CU) en el Sistema Público de Salud de Cataluña (CatSalut) en la última década y su mortalidad asociada.

**Métodos:** Se identificaron todos los pacientes residentes en Cataluña con diagnóstico de EII y con un procedimiento de resección intestinal realizada durante el período 2007-2016. Se analizó la mortalidad postoperatoria de los pacientes mediante el análisis de supervivencia Kaplan-Meier. Fuente de datos: base de datos de morbilidad del CatSalut.

**Resultados:** La prevalencia de EII durante el período del estudio aumentó de 7.600 a 14.744 (EC) y de 14.077 a 24.152 (CU). Se identificaron 1.661 resecciones intestinales en EC, que resultaron en una tasa anual de resección que osciló entre 1,08 y 1,92%. En CU, se registraron 738 colectomías, con una tasa anual entre 0,31 y 0,49%. Las intervenciones quirúrgicas se efectuaron en un total de 55 centros, que se agruparon según el número total de intervenciones durante el período de estudio en: alto volumen (si > 100, n = 7), medio volumen (si 50-100, n = 7) o bajo volumen (si 50, n = 41). 43 centros realizaron menos de 20 cirugías en CU durante este período. La probabilidad acumulada de mortalidad se muestra en la tabla.

	Mortalidad intrahospitalaria (IC95%)	Mortalidad 30 días (IC95%)	Mortalidad 90 días (IC95%)
EC Alto volumen	1,2% (0,5-1,9)*	1,6% (0,8-2,4)*	1,7% (0,9-2,5)*

Medio volumen	4,4% (2,1-6,7)	4,8% (2,4-7,1)	
Bajo volumen	3,4% (1,5-5,2)	4,5% (2,3-6,7)	
Alto volumen	5,2% (2,9-7,3)	5,7% (3,3-7,9)	6,5% (4,0-8,9)
CU Medio volumen	5,1% (1,3-8,7)	8,0% (3,4-12,4)	8,0% (3,4-12,4)
Bajo volumen	5,2% (2,2-8,1)	6,6% (5,2-9,9)	7,1% (3,6-10,5)

\*p 0,05.

**Conclusiones:** La tasa anual de cirugía resectiva en Cataluña es del 1-2% en EC e inferior al 0,5% en CU. Los centros con un alto volumen de actividad quirúrgica en EII realizaron la mayoría de cirugías en CU y tienen una menor mortalidad en la cirugía de la EC.