



Gastroenterología y Hepatología



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

165 - CARACTERÍSTICAS Y PREVALENCIA DE CÁNCER COLORRECTAL DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME DE POLIPOSIS SERRADA EN UN HOSPITAL COMARCAL

L. Hernández y M. Vázquez Seoane

Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero.

Resumen

Introducción: El síndrome de poliposis serrada es la poliposis más frecuente en nuestro medio, pero son escasos los estudios que nos muestren sus características fuera de centros de referencia.

Métodos: Estudio epidemiológico de datos tanto retrospectivos como retrospectivos del seguimiento de una cohorte de pacientes con SPS.

Resultados: en 51 pacientes con SPS con edad media de 58,6 años al diagnóstico y predominancia de hombres (74,5%) se realizaron una mediana de 4 colonoscopias (RIQ 2-5) observándose una mediana de 25 lesiones serradas (RIQ 22-43), 4 adenomas (RIQ 2-9). Se detectaron 9 CCR (17,65%) a una edad media de 63,14 años, todos ellos antes o en el momento del diagnóstico. Los pacientes con adenomas avanzados (OR 23,05) y serrados > 10 mm proximales a sigma (OR 14,97) se asociaron a CCR en el estudio multivariado ajustado por edad.

Conclusiones: El síndrome de poliposis serrada presenta una alta prevalencia de CCR y de lesiones en su seguimiento. Se recomienda una especial vigilancia a los que presentes lesiones serradas proximales > 10 mm o adenomas avanzados.