



RESPUESTA

Sr. Director: Agradeciendo de antemano su atención y en referencia a la carta titulada «¿Linfadenomegalia o proceso papilar?» sobre el artículo «Linfadenomegalías en pacientes con hepatopatía crónica»¹, en nuestra opinión la existencia del proceso papilar del caudado es bien conocida en la bibliografía radiológica², por lo que el conocimiento de ésta, tanto ultrasonográfico como en otras técnicas, es importante para no confundirlo con otras estructuras. Nosotros hemos tenido en cuenta la existencia del proceso papilar del caudado en función de su localización, morfología, ecogenicidad y relaciones anatómicas³, no considerándolo como linfadenomegalia.

M.D ANTÓN Y F. DELGADO^a
Servicios de Aparato Digestivo y ^aRadiodiagnóstico.
Hospital Dr. Peset. Valencia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Antón MD, López A, Delgado F, Cremades A, Alcaraz MJ, Gómez F, et al. Linfadenomegalías en pacientes con hepatopatía crónica. Gastroenterol Hepatol 2001;21:371-4.
2. Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW. Diagnostic Ultrasound. St. Louis: Mosby-Year Book, 1991.
3. Donoso L, Martínez-Noguera A, Zidan A, Lora F. Papillary process of the caudate lobe of the liver. Sonographic appearance. Radiology 1989;173:631-3.

o

VI JORNADA NACIONAL DE ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA

Barcelona, 26 de octubre de 2002.

Sede: Casa de Convalescència de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
C/ Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona.

Secretaría Científica: Dr. Xavier Cussó i Fresquet. Servei de Patología Digestiva de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Tel.: 93 291 91 39.
Fax: 93 291 92 78.
Correo electrónico: xcusso@santpau.es

Secretaría técnica: Meeting & Congress. C/ Hipòlit Lázaro, 34, entl. 4.^a.
08025 Barcelona.
Tel.: 93 210 05 06.
Fax: 34 93 213 06 37.
Correo electrónico: meeting@meetingcongress.com