



Imagen en medicina

Insuficiencia renal: la importancia de la radiografía simple de abdomen



Renal insufficiency: The importance of simple abdominal radiography

Miguel Martín Asenjo*, Javier Miguel Martín Guerra y José María Prieto de Paula

Servicio de Medicina Interna, Hospital clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España




Figura 1.

Varón de 49 años, fumador de 15 cigarrillos/día y con antecedentes personales de úlcus péptico y varios episodios de prostatitis aguda. Consulta por dolor abdominal intenso, de aparición relativamente brusca. Refería, además, proceso de 2 semanas de evolución con molestias urinarias, dificultad para iniciar la micción, nicturia de 4-5 veces y urgencia miccional.

En la analítica sanguínea destacaba un fracaso renal agudo (creatinina 4,1 mg/dl, urea 139 mg/dl y potasio 4,8 mmol/l) con leve elevación de los reactantes de fase aguda. La radiografía de abdomen (fig. 1) mostró un globo vesical, confirmado posteriormente con ecografía que, además, reveló ectasia uretero pielocalicial bilateral grado moderado severo.

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: miguel.martin.asenjo@gmail.com (M. Martín Asenjo).