

Imagen en medicina

Cisticercosis muscular

Muscular cysticercosis

Irma I. Flores Ponzio*, Christian E. Aguayo Jimenez y Ana L. Hernandez Barrón

Servicio de Medicina Interna, Hospital General de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México



Una mujer de 83 años, originaria de Coahuila de Zaragoza, México, sin comorbilidades, fue referida de su centro de salud al sufrir una caída de su propia altura, con superficie de contacto a nivel de la articulación glenohumeral. Se evidenciaron múltiples lesiones radiopacas de densidad calcio menores de 1 cm, localizadas en el tejido blando (fig. 1); debido a estos hallazgos se solicitó una serie ósea completa, evidenciando la presencia de las mismas calcificaciones elípticas en forma de «semilla de mijo» o «arroz inflado» diseminadas en la pelvis y los miembros inferiores (fig. 2), por lo que se estableció el diagnóstico de cisticercosis músculo cutánea, debido a la imagen característica de cisticercos en fase quística. La paciente estaba asintomática, sin alteraciones en la analítica, seguía una dieta rica en cárnicos y productos lácteos. Se estableció el diagnóstico de cisticercosis diseminada.




Figura 1. Radiografía AP de hombro derecho: se observan calcificaciones (flechas blancas) en forma de «cigarro».

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: irmaflorespz24@gmail.com (I. I. Flores Ponzio).



Figura 2. Radiografía AP de pelvis: múltiples calcificaciones en forma de «semilla de mijo» o grano de arroz que en conjunto dan una apariencia característica de «cielo estrellado» (área dentro de círculo).