



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

411/126 - CONSULTA DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA SOBRE ECZEMAS. CRITERIOS DE DERIVACIÓN

C. Vega Calzada¹, D. Palacios Martínez², R. Prats Mas³, T. Eyaralar Riera⁴, L. Salar Ibáñez⁵

¹Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacia Ibáñez. Gavá. Barcelona. ²Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isabel II. Parla. Madrid. ³Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacia La Pedrera. Denia. Alicante. ⁴Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacia Eyaralar. Carbayin Alto. Asturias. ⁵Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacia Salar. Valencia.

Resumen

Objetivos: Estudiar la demanda de Indicación Farmacéutica relacionada con eczemas.

Metodología: Se consensuan 10 criterios de derivación (CD) con SEMERGEN: situaciones en las que el farmacéutico debe derivar al médico para valoración, aunque se acepta que en algunos casos no se derive al paciente, y/o que el paciente rechace dicha derivación. Los casos se registran en una web habilitada al efecto. Si se produce la derivación se entrega al paciente un informe para el médico.

Resultados: 140 farmacéuticos recogieron 650 casos de consultas por eczema, 58,5% mujeres. El rango de edad fue de 0 a 99 años, siendo el promedio 40,4 años (DE 23,4) 38,4 mujeres, 43,3 hombres. El grupo de edad más representado fue de 25 a 50 años con el 40,9% de los casos. 375 pacientes presentaban al menos un CD siendo 46 los que presentaban más de 2. No hay diferencias en el número de CD en función de la edad o el sexo. Todos los pacientes con CD eran susceptibles de ser derivados al médico, pero el farmacéutico decidió no derivar a 40 (10,7%). No hubo diferencias significativas en cuanto a sexo, pero si en cuanto a la edad. No se propuso derivación a un 7,0% de los que estaban por encima de la mediana de edad (viejos) y a un 14,2% de los que estaban por debajo (jóvenes). De los 335 a los que se les propuso la derivación 60 (17,9%) no aceptaron. No hubo diferencias en función del sexo ni de la edad. EL CD más frecuente fue “Sospecha de lesión cutánea sin diagnóstico” con un 22,6%, seguido de “Extensión de las lesiones” 15,3%. El primer CD citado fue el que menos se derivó al médico, un 81,1%, y de ellos, un 18,4% rechazaron la derivación. El segundo CD que menos se derivó al médico fue “Sospecha de eczema inducido por medicamentos tópicos y/o cosméticos” 81,4%, y éste fue el que más rechazo obtuvo, un 29,8%.

Conclusiones: El programa supone ventajas por la seguridad que aporta. Un 17,9% de los pacientes no aceptaron la derivación.

Palabras clave: Indicación farmacéutica. Farmacia comunitaria. Eczema. Dermatología.