



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

228/9 - DIFERÈNCIES EN L'ADHERÈNCIA AL TRACTAMENT FARMACOLÒGIC ENTRE LA POBLACIÓ URBANA I RURAL DE LA MATEIXA ZONA

R. Raventós Torner^a, A. Borrueu Llovera^b, J. Gago Rius^c y J. Tost Mora^b

^aInfermera. Unitat de Gestió de Casos Alt Penedès-Garraf. ^bInfermer. Adjunt d'Infermeria; ^cMetge de Família. Director Mèdic. ABS Sant Sadurní d'Anoia. Barcelona.

Resumen

Objectius: 1) Estimar l'adherència al tractament farmacològic dels pacients amb Clinical Risk Group (CRG6: dues patologies i CRG7: tres patologies o més) i 2) determinar les patologies més prevalents en aquesta població.

Metodologia: Estudi transversal descriptiu dels pacients amb un CRG6 i CRG7. Com a instrument de mesura es va dissenyar una enquesta prèviament validada, amb quatre preguntes inicials que corresponen al qüestionari del Test Morisky-Green. Emplaçament: Atenció Primària: Àrees Rural i Urbana de Sant Sadurní d'Anoia província de Barcelona (Espanya). Participants: La població objecte va ser de 3.958. Es van recollir un total de 114 enquestes, s'han donat per vàlides 108 (94,7%), 6 enquestes (5,0%) van ser desestimades. Mesures principals: Variable principal: Adherència al tractament (test de Morisky Green) i variables condicionants: sociodemogràfiques i clíniques.

Resultats: El nivell de compliment terapèutic va ser del 68,5% (IC 59,7-77,3%), superior a l'obtingut en altres estudis, El compliment a la zona rural 76,7% (IC 69,7-85,5%) és similar al de la zona urbana 65,4% (IC 56,4-74,4%) (p = 0,258).

Conclusions: No hi ha una diferència significativa en el compliment entre la zona rural i la urbana. Hi ha una diferència rellevant en la prevalença de la insuficiència cardíaca, que és significativament superior a l'àrea rural respecte a la urbana.