



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

228/4 - PRESENCIA DE ALTERACIONES VASCULARES EN PACIENTES CON GFE > 60 ML/MIN/1,73 M² Y SU RELACIÓN CON LA DISLIPEMIA. ESTUDIO NEFRONA

I. Gil Gil^b, P. Beato Fernández^c, F. Alonso Moreno^d, M. Prieto Díaz^e, M. Artigao Ródenas^f, C. Santos Almozano^g, E. Fernández Giráldez^h, A. Betriu Ródenasⁱ y R. Genique Martínez^j

^aCAP Vielha. Lleida. ^bMédico de Familia. CS Vielha. ABS Aran Vielha. Lleida. ^cConsultorí Barri Cotet. Premià de Dalt. ^dMédico de Familia. CS Sillería. Toledo. ^eMédico de Familia. CS Vallobín. Oviedo. ^fMédico de Familia. CS Zona III. Albacete. ^gMédico de Familia. CS Azuqueca de Henares. Guadalajara. ^hNefróloga. Servicio de Nefrología; ⁱNefróloga. Servicio de Nefrología (UDETMA). Hospital Arnau de Vilanova. Lleida. ^jMédico de Familia. CAP Sant Carles de la Ràpita. Tarragona.

Resumen

Objetivos: Analizar el impacto de la presencia del factor de riesgo dislipemia en una población sin AP de ECV previa y con GFe > 60 ml/min/1,73 m².

Metodología: Análisis transversal y descriptivo de la población control (18-74 años) incluida en el estudio Nefrona (estudio observacional, prospectivo y multicéntrico) en el que se analizan los 559 del grupo control (sin AP de ECV previa y con GFe > 60 ml/min/1,73 m²), elegidos al azar de consultas de AP de 6 CCAA. Un equipo itinerante con técnicos en imagen ecográfica analiza mediante ecografía vascular (carótida, braquial y femoral) e ITB a todos los pacientes.

Resultados: De los 559 pacientes incluidos en el grupo control del estudio (46,7% mujeres, edad: 54,6 ± 11,6 años) y a los que por primera vez se les estudia por ecografía vascular e ITB, presentan dislipemia el 35,2% (n = 197). Se observa que los pacientes dislipémicos vs no dislipémicos presentan un Score patológico basal un 10,1% mayor (p = 0,016; OR 1,82 [1,11-2,97]), un GIM patológico/placa carotídea un 21,4% mayor (p = 0,000; OR 2,39 [1,66-2,44]), placa en carótida un 23,7% (p = 0,000; OR 2,63 [1,83-3,79]), y un ITB patológico/placa femoral un 14,9% mayor (p = 0,001; OR 1,83 [1,28-2,61]).

Conclusiones: En una población sin criterios de IRC y con un riesgo Score fundamentalmente bajo-moderado, la condición de presentar dislipemia condiciona una mayor afectación vascular en cualquier territorio, lo que confiere a estos pacientes un mayor riesgo de presentar un evento cardiovascular.