



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

284/43 - L'ADMINISTRACIÓ FARMACOLÒGICA ALS DOMICILIS

E. Castaño Pérez^a, C. Moreno Martín^a, T. Vila Parrot^b, M. Biendicho Palau^b, T. Alonso Sancho^b i J. Cortes Genescà^b

^aMetge Resident de Medicina Familiar i Comunitària. Centre de Salut de Balaguer. Lleida. ^bMetge de Família. Centre de Salut de Balaguer. Lleida.

Resumen

Introducció: En la societat que tenim es difícil tenir informació sobre l'administració dels fàrmacs prescrits per aquest motiu vam realitzar un estudi per avaluar-ho.

Objectius: Determinar si els fàrmacs prescrits s'administren correctament als domicilis dels pacients de la població pertanyent a l'àrea bàsica de l'ABS Balaguer amb medicació crònica

Disseny: Estudi retrospectiu observacional, d'una cohort de 230 pacients, seleccionats de manera aleatòria per professionals sanitaris d'una àrea bàsica. Anàlisi de la farmaciola domiciliar i d'uns formularis (Morrisky-Green, Hermes i Herrera) i així garantir una lectura correcta referida a la bona administració farmacològica.

Cronograma: Des de desembre de 2015 fins a març 2017.

Emplaçament: ABS Balaguer (Lleida).

Material i mètodes: En una primera visita d'atenció primària, es valorarà si el subjecte compleix els criteris d'inclusió, es proposa la participació a l'estudi, els pacients consenten i es realitza la visita domiciliar amb inspecció i inventari de la farmaciola i la realització dels testos.

Aplicabilitat: Millora els objectius terapèutics, la qualitat de vida del pacient i optimitzar els recursos econòmics destinats a tal efecte. Per això hem realitzat un estudi per delimitar el grau de compliment d'aquests.

Resultats esperats: Els dos testos tenen resultats molt similars de compliment (69% i 63%). Per constatar la realitat material de les asseveracions dels pacients vam avaluar les farmaciols domiciliaries, sense trobar diferències significatives entre complidors i no complidors segons els testos. Es va observar que els fàrmacs més consumits eren els analgèsics i psicofàrmacs (74% i 42%).

Aspectes ètic-legals: Tots els pacients consenten ser inclosos en el estudi.

Bibliografia

1. Rodríguez Chamorro MÁ, García-Jiménez E, Amariles P, et al. Revisión de tests de medición del cumplimiento terapéutico utilizados en la práctica clínica. Aten Primaria. 2008;40:413-8.

2. Carhuallanqui R, Diestra-Cabrera G, Tang-Herrera J, Málaga G. Adherence to pharmacotherapy in hypertensive outpatients attended at general hospital. *Rev Med Hered.* 2010;21(4).
3. Martín Alfonso L, Grau Abalo JA. La investigación de la adherencia terapéutica como un problema de la Psicología de la Salud. *Psicología y salud.* 2004;14:89-99.
4. Fernández Lisón LC, Barón Franco B, Vázquez Domínguez B, et al. Errores de medicación e incumplimiento terapéutico en ancianos polimedicados. 2006;30:280-83.
5. Mendoza-Parra S, Merino JM, Barriga OA. Identificación de factores de predicción del incumplimiento terapéutico en adultos mayores hipertensos de una comunidad del sur de Chile. *Rev Panam Salud Publica.* 2009;25(2):105-12.
6. Escamilla Fresnadillo JA, Castañer Niño O, Benito López S, et al. Reasons for therapy non-compliance in older patients taking multiple medication. *Atención Primaria.* 2008;40:81-5.
7. Doucette WR, Vinel S, Pennathur P. Initial development of the Systems Approach to Home Medication Management (SAHMM) model. 2016.

Paraules clau: Administració. Fàrmacs. Domicili. Prescripció correcta.