



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/152 - Estrategias en Atención Primaria para mejorar la cobertura de la vacunación anti

L. Bort Llorca^a, F. Antón García^b, M.J. Richart Rufino^b, L. Pérez Ollero^a, C. Mir Sánchez^c, E. Correcher Salvador^d, G. Oliver Guimera^e y S. Pérez López^e

^aMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fuensanta. Valencia. ^bMédico de Familia. Centro de Salud de Fuensanta. Valencia. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Barrio de la Luz. Valencia. ^dMédico de Familia. Centro de Salud de Picassent. Valencia. ^eMédico Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fuensanta. Valencia.

Resumen

Objetivos: Comparar distintas estrategias para mejorar la cobertura vacuna antigripal en mayores de 64 años.

Metodología: Nuestro Centro de Salud (CS), informa de la vacunación antigripal mediante carteles. Se compararon las coberturas de las campañas 2010-2013 de cuatro consultas. C1: El MF había establecido una estrategia para vacunar en el mismo momento en que acudía el paciente. C2: el médico insistía sistemáticamente en la vacunación a los mayores de 64 años. C3-C4: los pacientes eran informados sólo por los carteles del CS. Se presentaron los resultados (2010-2013) en sesión clínica y se reevaluó la campaña 2014.

Resultados: Estas consultas atienden a un total de 1230 pacientes mayores de 64 años. Coberturas Global/C1/C2/C3/C4. 2010: 48,8%/50,4%/53,7%/47,8%/43%. (p = NS). 2011: 49,8%/50,4%/52,5%/51,2%/44,9% (p = NS). 2012: 50,2%/51,4%/53,7%/48,1%/47,5% (p = NS). 2013: 59,4%/76,1%/57,8%/53,2/51,9 (p = 0,000 en los datos de la C1 con respecto al resto); p = NS entre C2,C3,C4). 2014: 62,7%/82,4%/66,7%/51,5%/51% (p = 0,000 en los datos de la C1 con respecto al resto y C2 con C3-C4); p = NS entre C2-C3. Comparando las coberturas 2013-2014 dentro de cada consulta hay mejoría significativa en C1 (p = 0,001); C2 (p = 0,000). Vacunados en la consulta a demanda: C1 el 25% (2013) y 27% (2014). C2 nadie en 2013 y 9% en 2014. En la C3 y C4 todas las vacunaciones por enfermería en horario preestablecido.

Conclusiones: La estrategia “aquí te pregunto aquí te vacuno” de la C1 ha mejorado significativamente la cobertura vacunal (2013-2014). La C2 en 2014 ha mejorado tras adoptar actitud más proactiva.