Semergen. 2015;41 (Espec Congr):142

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

160/2806 - Deterioro cognitivo no conocido en la población mayor de 65 años incluida en el estudio pycaf

Y.A. Silvero[a], F.J. Fagúndez Santiago[b], L. Araujo Márquez[c], R.C.Fuentes Mendoza[d], M.Á. Fandiño Márquez[e], E.G. Laura Asillo[b], M.Á. Babiano Fernández[f], I. Matos Rojas[b], B.Parente Gómez y J. Dorado Navarro[g]

[a]Médico de Familia. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. [b]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Bárbara. Toledo. [c]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Fernando. Badajoz. [d]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puebla de Montalbán. Toledo. [e]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Manuel Encinas. Cáceres. [f]Médico de Familia. Centro de Salud de Argamasilla de Calatrava. Ciudad Real. [g]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Goya. Madrid.

Resumen

Objetivos: Evaluar la función cognitiva de los pacientes > 65 años incluidos en el proyecto PYCAF (Prevalencia Y Características clínicas y socio-sanitarias del Anciano Frágil asistido en AP).

Metodología: Estudio observacional, analítico y multicéntrico en condiciones de práctica clínica en pacientes > 65 años, por médicos de familia en Centros de AP de varias CCAA. El estudio fue aprobado por el CEIC del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Los datos se obtuvieron de la historia clínica informatizada. Se registraron variables socio-demográficas y clínicas de interés. La valoración del nivel cognitivo se realizó mediante el cuestionario corto de Pfeiffer (10 preguntas). 0-2 errores se interpreta como normal; 3-4 errores deterioro leve; 5-7 errores deterioro moderado y 8-10 errores deterioro grave. Esta puntuación se corrige en función del nivel de escolarización (baja escolarización se permite un error más). Se excluyeron los pacientes con antecedentes de alteración cognitiva o con problemas para comprender los cuestionarios del estudio.

Resultados: Se incluyeron 1.255 pacientes, edad media (DE) de 75,8 (6,7) años. 143 pacientes (11,4%) presentaron disfunción cognitiva (puntuación igual o superior a 3). Deterioro leve-moderado 130 pacientes (90,9%), deterioro grave 13 pacientes (9,1%).

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio indican que uno de cada 10 pacientes > 65 años presenta deterioro cognitivo no conocido y de estos, 1 de cada 10 es grave.

1138-3593 / © 2015 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.